AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 – 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 12/22 di **Fiorello Terzariol** del **01 luglio 2022**

CONDIFESA TVB: DATI METEOROLOGICI MESE DI G I U G N O 2 0 2 2

Temperatura media: **24,3**°C (ben 3,4°C sopra la media!); **Umidità** relativa media dell'aria: **66**%; **Piovosità**: **34** mm (237 mm dall'inizio dell'anno, 222 mm sotto la media stagionale); **Giorni piovosi**: **6** (29 giorni di pioggia nei primi sei mesi dell'anno!).

VITE: SEMPRE PRIORITA' ALLA LOTTA ALLA FLAVESCENZA DORATA. EMERGONO PUNTUALI I SINTOMI DA MAL DELL'ESCA (foto in copertina).

Ultima decade di giugno con valori termici piuttosto elevati, con medie attorno ai 25°C e massime anche superiori ai 35 gradi! L'agognata piovosità ha caratterizzato, a macchia di leopardo, in particolare la tarda serata del 28 e parte della mattinata del 29 giugno (anche 50 mm in alcune località dell'area collinare), ovviamente non rimediando alla preoccupante crisi idrica di quest'anno.

Continuano a susseguirsi le varie fasi vegetative, che confermano il netto anticipo fenologico rispetto al 2021. Nella scorsa annata i primi acini invaiati si sono manifestati nel Pinot grigio all'inizio della terza decade di luglio, mentre nel 2020 i primi acini invaiati nella stessa varietà si erano evidenziati attorno al 7 luglio, anche se successivamente erano proseguiti molto lentamente.

Iniziano i riscontri del **fungo peronosporico** nelle femminelle e talvolta anche con le prime forme larvate nei grappoli, in particolare all'interno della chioma vegetativa, soprattutto se mal gestita nelle operazioni di palizzamento e/o di cimatura. Continuare quindi con gli interventi antiperonosporici a base di sostanze **Cerodinamiche**, o con **Rameici** "aiutati" dal **Cymoxanil**, o abbinati, in particolare per i biologici, all'**Olio essenziale di arancio dolce** (con attività antioidica, in questo caso ridurre lo Zolfo).

Ripristinare la copertura quanto prima con il prodotto **Rameico**, in occasione di **grandinate** o **forti piovosità**.

Attenzione agli eventuali focolai di **Oidio**. In tali casi intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**. In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato** a dosi massime da etichetta.

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli.
Leggere sempre attentamente le ETICHETTE dei prodotti fitosanitari da impiegare!