AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 – 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 13/23 di **Fiorello Terzariol** del **12 luglio 2023**

VITE: SI CONFERMA LA PRESENZA DELLE PRINCIPALI MALATTIE FUNGINE: PERONOSPORA, OIDIO E ULTIMAMENTE BOTRITE SUL GRAPPOLO. FREQUENTI I FENOMENI DI APOPLESSIA E NATURALMENTE SEMPRE ALTA L'ATTENZIONE NEI CONFRONTI DELLA FLAVESCENZA DORATA.

Notevole innalzamento termico nell'ultimo periodo meteorologico, con temperature attorno ai 28°C di media, abbinate ad elevate umidità (sopra il 70%). Le piovosità, e non solo, si sono ripresentate nelle ultime ore incentivando ancor di più le patologie fungine riportate nel titolo.

La **fenologia** evidenzia fasi che presentano grappoli in chiusura, con un timido inizio di invaiatura nel Pinot nero ma molto occasionale nel Pinot grigio.

Sempre maggiori i riscontri della **Peronospora** nelle ultime foglie e nelle femminelle, con presenza della larvata in diverse varietà, ma in particolare nel Merlot (un classico).

Vista la situazione sopradescritta, si consiglia di continuare ancora con gli interventi antiperonosporici a base di sostanze **Cerodinamiche**, o con **Rameici** "aiutati" dal **Cymoxanil**, o abbinati, in particolare per i biologici, all'**Olio essenziale di arancio dolce** (con attività anche antioidica, in questo caso ridurre lo Zolfo).

Attenzione a ripristinare quanto prima il prodotto Rameico (cambiando prodotto commerciale…), in occasione di **grandinate** o **forti piovosità**.

Con eventuali focolai di **Oidio** intervenire immediatamente con lo **Zolfo in polvere**.
In assenza del fungo e a carattere preventivo, impiegare lo **Zolfo micronizzato** a dosi massime da etichetta.

Contro la **Botrite,** soprattutto per le varietà a grappolo compatto, nella prossima fase di **invaiatura** e dopo i necessari interventi sulla vegetazione per esporre al meglio i grappoli, si consiglia di impiegare un **antibotritico specifico** preferibilmente di origine biologica (come indicato nelle linee tecniche della Regione del Veneto). Questo perché si evitano residui nel vino e si ottiene anche un miglior controllo del marciume acido.

Puntuale esplosione del **Mal dell'esca** e delle forme di **apoplessia** (repentino disseccamento delle piante) derivate dal particolare andamento meteo vegetativo dell'annata. Contro la **Cocciniglia pseudococcide** (Pseudococcus comstocki) intervenire ora con gli insetticidi opportuni. Mentre contro la **Cocciniglia farinosa** (Planococcus ficus) l'eventuale trattamento va posticipato alla prossima settimana.
Valutare bene la specie presente!!

Terminate le “finestre” indicate per i trattamenti insetticidi obbligatori (convenzionale, bio, zona infestata e cuscinetto) contro lo **Scaphoideus titanus** vettore della **Flavescenza dorata** della vite. Eventuali ulteriori indicazioni di intervento saranno dettate solamente sulla base dei riscontri nei monitoraggi dell’insetto tramite le catture nelle trappole cromotropiche presenti sul territorio regionale.

Si raccomanda di **estirpare** immediatamente le piante che presentano sintomi riconducibili alla FD!!!

Attenzione ai divieti sull’uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata.

Peronospora larvata su Pinot grigio

Inizio Botrite su Chardonnay

CondifesaTVB
Tutela e sviluppo dell'agricoltura