AGRINOTIZIE CONDIFESA TVB

CONDIFESA TREVISO VICENZA BELLUNO
Consorzio Provinciale per la Difesa delle Attività Agricole dalle Avversità

Via A. da Corona, 6 – 31100 Treviso (loc. San Giuseppe)
Tel. 0422.262192 - Fax 0422.235318 - Mail: info@condifesatvb.it

Bollettino n. 17/23 di **Fiorello Terzariol** del **10 agosto 2023**

VITE: MOLTO LENTO L'AVANZAMENTO DELLE FASI FENOLOGICHE!

L'ultimo periodo meteorologico ha evidenziato valori termici molto contenuti, attorno ai 20°C di media con massime di 24-25°C! e umidità sotto il 70%. A macchia di leopardo le piovosità più o meno abbondanti nella prima settimana di agosto.

La **fenologia** continua ad avanzare molto lentamente a causa del permanere del cielo coperto di questi ultimi giorni (poca luce/poca fotosintesi) e ciò sta determinando uno slittamento sulle date di inizio vendemmia di questo travagliato 2023.

Dal lato fitosanitario, ancora attenzione con gli ultimi trattamenti (**Rameici**) contro la **Peronospora** e (**Zolfo**) contro l'**Oidio** che potranno ora interessare solo le varietà medio tardive e tardive, con i giovani impianti.

Sempre maggiore la presenza del **Mal dell'esca** nei diversi ambienti viticoli, che si somma al puntuale riscontro della Flavescenza dorata ed in particolare alle numerose e ampie grandinate (con trombe d'aria) di quest'anno. Annus horribilis!

Si ricordano gli interventi contro le **Tignole** (in particolare Tignoletta) di terza generazione.
Si consiglia di intervenire ove si accerta il superamento della soglia e su varietà a maturazione tardiva, preferibilmente con prodotti che non lasciano residui (es. Bacillus thuringiensis).

Nella lotta alla **Flavescenza dorata**, si riporta l'attenzione di diagnosticare con competenza quali sono le piante sintomatiche da FD, per attuare l'obbligo di estirpo (da DGR Veneto di Lotta obbligatoria n.47 e n.48 del 26 e 29.05.2023). Si evidenzia, ancora una volta, che piante sintomatiche di virosi da "accartocciamento fogliare", o sintomi derivati da strozzature anulari sui tralci e sui germogli provocate dalle punture della "Cicalina bisonte" (Stictocephala bisonia), NON vengano confuse con piante da FD o da Giallumi!!!

La **foto A** evidenzia una classica vite sintomatica da **Flavescenza dorata**, con la perdita dei grappoli, la mancata maturazione dei tralci e l'ingiallimento e l'accentuato accartocciamento delle foglie.

La **foto B** riporta una vite sintomatica di virosi da "**accartocciamento fogliare**" che evidenzia il mantenimento del colore verde delle foglie, la maturazione dei tralci e la presenza dei grappoli che potranno subire solo un ritardo nella maturazione.

La **foto C** manifesta un rossore (vite a bacca nera) derivato dall'attività trofica (alimentare) della Cicalina bisonte sopradescritta.

Foto A (Flavescenza dorata)

Foto B (Accartocciamento fogliare)

Foto C (Accartocciamento da Cicalina bisonte)

Rispettare i **tempi di carenza** delle sostanze attive da impiegare!!!

Attenzione ai divieti sull'uso di determinate sostanze attive riportati nei Regolamenti comunali di polizia rurale e/o non consigliati dai Protocolli/Vademecum/Metodi viticoli e alle limitazioni imposte agli aderenti al SQNPI (Sistema Qualità Nazionale di Produzione Integrata).

Per ulteriori informazioni e notizie sempre aggiornate seguiteci su
Condifesa TVB / Facebook…!!

CondifesaTVB
Tutela e sviluppo dell'agricoltura