CANTINA MARENO S.C.A.

PROGETTO NOVUS

Assistenza Socio
+39.3516218560

BOLLETTINO N. 3 del 16/04/2025

ANDAMENTO METEO E SVILUPPO VEGETATIVO

Evoluzione generale

Un paio di perturbazioni in successione arrivano dall'Atlantico e inducono temporanee depressioni centrate sul Mediterraneo occidentale, richiamando sull'Italia un significativo flusso umido e mite dai quadranti meridionali; per il Veneto ne conseguono giorni di frequente nuvolosità e varie precipitazioni, con un richiamo sciroccale più significativo all'inizio, che porta una relativa instabilità con culmine giovedì; nelle giornate successive la probabilità di precipitazioni diminuisce ed aumenta un po' l'escursione termica diurna. (Fonte ARPAV)



Previsioni

Le previsioni meteo dei giorni a seguire risultano molto incerte a causa dell'evento metereologico molto intenso che ha caratterizzato il nostro areale.

Sviluppo vegetativo

L'innalzamento termico dei giorni scorsi e la buona disponibilità idrica presente nei suoli ha dato ulteriore spinta alla ripresa vegetativa portando al dispiegamento della seconda e terza foglia su Glera e della prima e talvolta seconda foglia su gran parte delle varietà a germogliamento tardivo.

Rimane, comunque, a livello territoriale una certa difformità nello stadio di sviluppo vegetativo

Glera-Fase BBCH 14 "quattro foglie spiegate"

Chardonnay-Fase BBCH 13 "tre foglie spiegate e abbozzo grappolo visibile"

ANDAMENTO INFEZIONE PERONOSPORICA E DIFESA FITOSANITARIA

Le piovosità dei giorni scorsi hanno dato il via ad alcune infezioni peronosporiche nei diversi areali delle Macro Zone.

Mareno di Piave



Come si evince dai grafici allegati (fonte ProgettoNatura) i modelli previsionali hanno registrato su gran parte delle Macro Zone la partenza di una prima infezione peronosporica avviatasi con le precipitazioni appena avvenute. In funzione di temperatura e umidità dell'areale stesso vi sono avanzamenti dello stato di incubazioni pari ad un 12-14% giornaliero. Tali dati fanno supporre che l'evasione della possibile infezione avverrà indicativamente 8-9 giorni dopo l'evento piovoso.

Visto l'andamento meteo molto incerto e considerate le condizioni di ristagno idrico all'interno dei nostri vigneti, trattandosi di una possibile infezione primaria di Peronospora, si consiglia di trattare tra **martedì 22** e **mercoledì 23 aprile** con i seguenti prodotti:

SQNPI e Convenzionale:

- **Peronospora**: da preferire prodotti a base **Dithianon** (in alternativa **Folpet**) con l'aggiunta di **Fosfonati** solo dove la vegetazione ha raggiunto almeno le 4 foglie distese ;
- **Oidio**: prodotti a base **Zolfo**, con aggiunta di **Meptyldinocap** nelle zone storicamente problematiche.

NON UTILIZZARE in questa fase altri prodotti ad azione sistemica, citotropica o translaminare

E' VIETATO L'USO di FOSETIL ALLUMINIO non consentito da specifici Mercati Internazionali

Biologico:

Nel caso della conduzione biologica, vista la difficoltà di gestione del principale fungo parassita "Peronospora", se si presentano le condizioni per un intervento preventivo prima dei prossimi eventi piovosi, sarebbe opportuno intervenire, avendo però cura di rientrare prima della possibile evasione della malattia, sempre nelle giornate di **martedì 22** e **mercoledì 23 aprile.**

I prodotti consigliati sono:

- **Peronospora**: prodotti a base **rame**, **150-200 g/ha** di rame metallo. Da preferire formulati a base poltiglia bordolese o ossicloruro;
- **Oidio**: prodotti a base **zolfo**, per favorire l'adesività valutare l'impiego di prodotti liquidi o adesivanti.

CONCIMI: Applicazioni Fogliari

In entrambe le situazioni (SQNPI-Convenzionale e Biologico) è consigliabile utilizzare stimolanti fogliari o concimi a base azoto e microelementi per sopperire all'eventuale insorgenza di clorosi.

"SI RACCOMANDA DI LEGGERE ATTENTAMENTE LE ETICHETTE DEI FORMULATI COMMERCIALI PRIMA DELL'UTILIZZO E DI SEGUIRE LE INDICAZIONI, PRESTANDO PARTICOLARE ATTENZIONE ALLE FRASI DI PERICOLO E ALLE EVENTUALI FASCE DI RISPETTO."